

	<b>FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS</b>	CFS: 81/2 Sup. 1  Abril 1981
	<b>ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE</b>	
	<b>ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION</b>	

Tema II del  
programa provisional

COMITE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL

Sexto período de sesiones

Roma, 8 - 15 de abril de 1981

EVALUACION DE LA SITUACION ACTUAL DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE  
LAS EXISTENCIAS EN EL MUNDO Y PERSPECTIVAS A CORTO PLAZO - NOTA DE ACTUALIZACION

1. Como se señala en el documento CFS: 81/2, la seguridad alimentaria mundial en 1981/82 dependerá de forma decisiva del resultado de las cosechas de cereales en 1981, dadas las reducidas existencias remanentes para cotrarrestar las pérdidas de cosechas. En esta fase inicial de la campaña, sin embargo, no puede estimarse la producción total de cereales, con un grado razonable de certeza. Hay operaciones específicas relativas a las perspectivas de la producción de trigo, ya que las dos terceras partes está ya creciendo, las condiciones de los cultivos han sido buenas hasta la fecha y se aproxima el momento de la recolección. Pero otros cereales importantes, entre ellos la mayor parte del maíz y del arroz, están por sembrar todavía y habrá que esperar varios meses más para poder evaluar las perspectivas de dichos cultivos.
2. En lo que respecta al trigo, los elevados precios en el momento de la siembra y las perspectivas de una demanda favorable estimularon un aumento de la superficie de plantación y, hasta la fecha los aportes de humedad han sido suficientes para asegurar un crecimiento satisfactorio. Se puede decir con razonable certeza que se obtendrán buenas cosechas en los Estados Unidos, la India y gran parte de Europa occidental. No obstante, podrían registrarse de aquí al momento de la cosecha, condiciones atmosféricas extraordinariamente adversas que empeoren la situación, principalmente en la U.R.S.S.; donde las variaciones climáticas son muy importantes. Así, según los primeros pronósticos de la FAO para 1981 la producción de trigo oscilará probablemente entre 430 y 480 millones de toneladas, frente al volumen - superior a la tendencia - de 446 millones, obtenido el año pasado.
3. En el hemisferio norte, se prevé que en los Estados Unidos la cosecha de trigo de invierno (que representa el 75 por ciento de la cosecha total de trigo de los Estados Unidos) superará el récord de 1980, ya que según estimaciones la superficie de cultivo ha aumentado en un 11 por ciento y han mejorado las perspectivas de los rendimientos, tras las lluvias generales registradas a finales de febrero y comienzos de marzo. Será necesario, sin embargo, que llueva oportunamente durante el resto de la campaña para obtener unos rendimientos normales, dado que la humedad del subsuelo sigue siendo todavía baja en algunas zonas.

4. En Europa occidental, las perspectivas del trigo de invierno son satisfactorias en la mayor parte de las zonas, salvo en España, Portugal y el norte de Italia, donde se prevé una disminución de los rendimientos, a causa de la sequía. En Europa oriental, se estima que la superficie destinada al cultivo de trigo de invierno es inferior a la del año pasado, pero las condiciones generales de los cultivos parecen ser satisfactorias. También en la U.R.S.S., el trigo de invierno se halla en buenas condiciones, pero en vista de las grandes variaciones climáticas típicas de este país, no es posible pronosticar todavía con certeza la producción total.

5. En el Lejano Oriente, en general, la superficie cultivada de trigo es mayor y, en muchos países, las condiciones de los cultivos son mejores que el pasado año. En particular, se espera que Bangladesh, la India, Nepal y el Pakistán obtengan buenas cosechas de trigo. Probablemente la producción triguera de China será mejor que la del año pasado, pero para lograr buenos rendimientos harán falta más precipitaciones en la mayor parte de las zonas de cereales de invierno de la China septentrional. En el Cercano Oriente, el trigo está creciendo bien en la mayoría de los países. En Africa del norte las lluvias han sido beneficiosas para el trigo en Argelia oriental y Túnez, pero la sequía ha causado daños en Marruecos.

6. No se ha sembrado todavía el trigo de primavera en el hemisferio norte ni el trigo de invierno en el hemisferio sur. Las intenciones de siembra en los Estados Unidos indican un pequeño incremento de la superficie destinada al trigo de primavera, y según las actuales indicaciones, es posible que se aumente también la superficie destinada al trigo en Australia, Canadá y Sudáfrica. Pero las siembras efectivas en ambos hemisferios dependerán en gran parte de las condiciones de humedad del suelo en el momento de la siembra.

7. En cuanto a los cereales secundarios, hasta la fecha sólo se ha sembrado un tercio de la superficie total, y únicamente se dispone de estimaciones sobre la producción del hemisferio sur, al que corresponde normalmente alrededor del diez por ciento de la producción mundial. Teniendo en cuenta estas estimaciones, las condiciones de los cultivos de centeno y cebada de invierno en el hemisferio norte, así como las intenciones de siembra de algunos países, posiblemente la producción de cereales secundarios oscile en 1980 entre 730 y 800 millones de toneladas, frente a los 722 millones del año anterior y a los 754 millones de 1979.

8. En el hemisferio sur, las perspectivas de los cereales secundarios son generalmente buenas en los países latinoamericanos. En la Argentina, la producción total de maíz y sorgo se estiman entre 18,7 y 20 millones de toneladas, mientras que la producción del año anterior - reducida a causa de la sequía fue sólo de 9,4 millones de toneladas. Se prevé que la producción de maíz del Brasil alcanzará el récord de 22 millones de toneladas, o sea el 10 por ciento más que en 1980. También en el sur de Africa las perspectivas de producción de los cultivos de cereales secundarios para 1981 son buenas en Botswana, Malawi, Sudáfrica, Swazilandia, Zambia y Zimbabue. En cambio, se prevén malas cosechas por segundo año consecutivo en Angola y Lesotho, debido a la sequía, así como en Mozambique, a causa de la sequía registrada al comienzo de la campaña y de extensas inundaciones en febrero. En Africa oriental, los cultivos de maíz de la estación corta de lluvias (secundaria) se han malogrado en Kenya, Somalia y partes de Tanzania, a causa de la sequía. Asimismo, la sequía ha afectado a las siembras de maíz de la "estación larga de lluvias" (principal) en Tanzania.

9. En Europa occidental se ha cultivado una superficie mayor de cereales secundarios de invierno (principalmente centeno y cebada). Las condiciones meteorológicas han sido favorables durante toda la campaña y dadas las actuales condiciones satisfactorias de los cultivos, podría esperarse una producción mayor que la del año pasado, salvo en España y Portugal, donde ha predominado la sequía. En Europa oriental, se redujo la superficie de cultivo de cereales secundarios, a causa de las condiciones meteorológicas desfavorables en el momento de la siembra. Se prevé una menor producción de cereales secundarios de invierno en Polonia y, en menor medida, en Rumania, donde recientemente grandes superficies fueron sumergidas por las inundaciones. En la U.R.S.S., el estado de los cereales secundarios de invierno (principalmente centeno) son satisfactorias, ya que la destrucción invernal fue limitada y los aportes de humedad del suelo fueron suficientes.

10. Las perspectivas para el sorgo y la cebada de invierno en la India (cuya producción representa el 20 por ciento de la producción total de cereales secundarios) son hasta ahora buenas. Se prevé una mayor producción que el año pasado.

11. En los Estados Unidos, que representan el 25 - 30 por ciento de la producción mundial de cereales secundarios y más del 60 por ciento de las existencias de exportación, las intenciones de siembra indican un incremento de la superficie destinada a la cebada, pero disminuciones marginales para el maíz y el sorgo. Si esas intenciones se materializan, tendrán de registrarse unos rendimientos sin precedentes en el maíz para que la producción aumente suficientemente para mantener en 1981/82 un nivel de utilización interna y de exportación de los Estados Unidos igual al de 1980/81.

12. Por lo que respecta al arroz, las tres cuartas partes de la superficie total se sembrarán a mediados de año, y los resultados de estos cultivos dependerán decisivamente de los monzones. En cuanto a los cultivos ya sembrados, la sequía ha afectado al cultivo principal en Sri Lanka. En el hemisferio sur, que aporta el 12 por ciento aproximadamente de la producción mundial, se prevé que la producción será mejor en Argentina, Colombia y Perú, igual a la satisfactoria cosecha del año pasado en Australia, e inferior en Madagascar y Uruguay. En los Estados Unidos, según las primeras intenciones de siembra se aumentará en un tres por ciento la superficie de cultivo. Las primeras previsiones de la FAO relativas a la producción de arroz cáscara en 1981 se harán en agosto, teniendo en cuenta el comportamiento de los monzones.

13. En resumen, aunque las condiciones de los cultivos de cereales son hasta la fecha aceptables o buenas, las condiciones meteorológicas influirán en el volumen de las cosechas que están ya en fase de crecimiento, así como de las que están todavía por sembrar. Durante el resto de la estación de cultivo, unas condiciones meteorológicas favorables en los principales países productores serán, pues, determinantes para obtener el incremento de la producción de cereales que se requiere para satisfacer las necesidades de consumo de 1981 y para reponer las existencias. El mundo deberá permanecer en estado de "alerta" y habrá que seguir de cerca las condiciones de los cultivos, así como la evolución de los mercados hasta que se recojan las principales cosechas de 1981.

